


التمرين الأول: (16 ن)

لمعرفة نوع الاستقلاب الخلوي المنتج للطاقة عند سلالتين من الخميرة A و B نقترح المعطيات التالية:
 نحضر وسطين حيويانين يحتويان على الكليكوز ويتوفران على نفس الظروف : الوسط A يحتوي على السلالة A و الوسط B على السلالة B .
 - يمثل الجدول التالي كمية الكليكوز في بداية و بعد 7 دقائق من التجربة .


يتناوب الرمز + مع الكمية	(t = 7 min)	(t = 0 min)	
	++	++++	كمية الكليكوز في الوسط A
	++	++++	كمية الكليكوز في الوسط B

- 1 - كيف تفسر النتيجة المحصل عليها في نهاية التجربة ؟
 تمثل الوثيقة 1 نتائج قياس تركيز الأكسجين و ثاني أكسيد الكربون في الوسطين A و B .




- 2 - حل الوثيقة 1 .
 3 - اعط تفسيرا لهذه النتائج.
 4 - استنتج نوع الاستقلاب الخلوي الطافي بالنسبة لكل سلالة.
 5 - اكتب التفاعل الإجمالي للاستقلاب الطافي للسلالة A .

تمثل الوثيقة 2 نتائج قياس تركيز الأكسجين في وسطين حيويانين أضيف إليهما الآثارول : الأول يحتوي على السلالة A و الثاني على السلالة B .




الوثيقة 3



- 6- حل الوثيقة 2 .
- 7- فسر هذه النتائج.
- تمثل الوثيقة 3 رسمن تخطيطيين للسلالتين A و B .
- 8- اعط الاسم المناسب للأرقام.
- 9- اعتمادا على الوثيقة 3 فسر سبب اختلاف الاستقلاب الطافي عند السلالتين .

نقوم بزرع السلالتين في وسطين يحتويان على كمية قليلة من الكليكوز و كمية كبيرة من الايثانول و بعد يومين نحصل على النتائج الممثلة في الوثيقة 4 .



- 10- اعتمادا على المعطيات السابقة و على معارفك فسر النتيجة المحصل عليها في كل وسط زراعة الوثيقة 4 .

التمرين الثاني: (4 ن)

من خلال عرض واضح و منظم بين الآليات المنتجة للطاقة على مستوى الميتوكوندري . (مع الإشارة إلى التفاعلات الكيميائية)