



الأحماض الكربوكسية



لسمينة الحمض نبدأ الاسم بلغز حمض ثم اسم المركب الهيدروكربوني الموافق مع إضافة لفظ "ويك".


أندرید الحمض

تحتوي جزيئه أندرید الحمض على المجموعة المميزة $-\text{CO}-\text{O}-\text{CO}-$. وتكتب الصيغة العامة للأندرید الحمض على الشكل التالي:



نسمة أندرید الحمض:

يشتق اسم الأندرید من اسم الحمض حيث يحذف لفظ حمض و يتم تعويضه ب الكلمة أندرید.




الاسترات

هو مركب عضوي يحتوي على المجموعة المميزة $-\text{COO}-\text{C}(=\text{O})-$. وتكتب الصيغة العامة للإسترات



نسمة الاستر:

يشتق اسم الاستر من اسم الأيون كربوكسيلات RCOO^- متبعاً باسم الجذر R' . مثال:



تفاعل الاسترة والحلماة:



مردود التفاعل:

$$r = \frac{n_{\text{exp}}}{n_{\text{th}}} \quad \text{حيث تمثل } n_{\text{exp}} \text{ كمية مادة}$$

النتائج المحصلة تجربياً، و n_{th} كمية مادة الناتج الحصول عليها إذا كان التحول كلياً.

إعداد
د. راجي نور الدين

كتاب
سلك بكالوريا 2009

ملخص 3

التحولات القسرية

التحليل الكهربائي تحول فسى

عندما يفرض مولد على مجموعة كيميائية تياراً في منحى معاكس لمنحى التيار الملاحظ خلال التطور التقاني لهذه المجموعة يمكن أن يرغموا على التطور في المنحى المعاكس لمنحى تطورها التقائي. يسمى هذا التحول التحليل الكهربائي.

كمية الكهرباء:

خلال التحليل الكهربائي تتعلق كمية الكهرباء Q بمدة التحليل Δt وشدة التيار المار في الدارة

$$Q = I \cdot \Delta t \quad \text{كمية الكهرباء } Q \text{ بكمية مادة الالكترونات } (\epsilon) \text{ المتبادلة بين}$$


الالكترودين خلال نفس المدة $Q = n(\epsilon)F$ الفاردي وهو القيمة المطلقة لشحنة مول واحد من الالكترونات $F = N_A(-e) = 9,65 \cdot 10^4 \text{ C.mol}^{-1}$.

الكحولات

نسمى الكحولات المركبات العضوية التي تحتوي على المجموعة الوظيفية $-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$

حيث لجميع الكحولات نفس الخواص الكيميائية.

صنف الكحولات:





النسمة:



تسمى الكحولات باسم الألkan الموافق لها مع إضافة اللاحقة "أول" (-ol) إلى نهاية الاسم

مسبيقة برقم يدل على موضع الكربون الوضيفي في السلسلة الكربونية.

أمثلة: بوتان-2-أول $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3$ مثيل بروپان-2-أول $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$



نميز بين 3 أصناف من الكحولات **الكحول الأولي**: $\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ حيث $\text{R} = \text{R}_1, \text{R}_2, \text{R}_3$ جذور.



الكحول الثاني: