



الصفحة

1

1

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة الاستدراكية 2012

عناصر الإجابة

المملكة العربية

وزارة التربية الوطنية
المركز الوطني للتقويم والامتحانات


7	المعامل	RR32	علوم الحياة والأرض	المادة
3	مدة الإنجاز	شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض		الشعبة أو المسلك

عناصر الإجابة وسلم التقييم

التمرين الأول (4 نقط)

النقطة	عناصر الإجابة	السؤال
0.5	- تعريف التنفس: هدم كلي للمادة العضوية في وسط حي هوائي ينتج عنه كمية مهمة من الطاقة على شكل ATP وحثالة معدنية خالية من الطاقة	
0.5	- تعريف التخمر: هدم جزئي للمادة العضوية في وسط حي لاهوائي ينتج عنه مواد عضوية تختزن كمية من الطاقة مع إنتاج كمية ضعيفة من الطاقة على شكل ATP.	
0.25	- طرق تجديد ATP اللازمة للتقلص العضلي:	
0.25	• الطرق السريعة اللاهوائية:	
0.25	← التفاعل الأول: $2ADP \rightarrow ATP + AMP$	
0.25	← التفاعل الثاني: $ADP + PC \rightarrow ATP + C$	
0.25	• الطرق البطيئة اللاهوائية:	
0.25	تفاعل التخمر اللبني: حرارة + $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CH_3CHOHCOOH + 2ATP$	
0.25	• الطرق البطيئة الهوائية:	
0.25	تفاعل التنفس الخلوي: حرارة + $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 38ATP$	
1	- الظواهر الحرارية المرافقة للتقلص العضلي:	
1	• الحرارة الأولية: تتميز بوسع مهم وتكون متزامنة مع الرعشة العضلية ، وتحرر لمدة زمنية قصيرة . مصدرها، تفاعل حلمأة الفوسفوكرياتين (يمكن قبول تفاعل حلمأة ATP)	
1	• الحرارة المتأخرة: تتميز بوسع ضعيف وتحرر بعد الرعشة العضلية وتدوم لمدة أطول. مصدرها التنفس الخلوي.	

التمرين الثاني (4 نقط)

0.25	- طور الشكل أ: الاستوائي.	1
0.25	- التعليل: صبغيات مضاعفة وجد واضحة وتتموضع على مستوى خط استواء الخلية.	
0.25	- طور الشكل ب: الانفصالي.	
0.25	- التعليل: انفصال صبغيني كل صبغي نتيجة انشطار الجزئي المركزي وهجرة قطبية للصبغيات	
0.75	إنجاز رسم تخطيطي للطور الانفصالي عند خلية حيوانية $2n = 4$	2
0.75		
0.75	- التعليل.	
0.75	- رسم وتموضع الصبغيات.	

النقطة	عناصر الإجابة	السؤال
0.25	قطعة ARNm بالنسبة لـ P53 العادي: AGU – GAU – AGG – CUA	3
0.25	السلسلة البيبتيدية بالنسبة لـ P53 العادي: Ser – ac.Asp- Arg – leu	
0.25	قطعة ARNm بالنسبة لـ P53 غير الفعال: AGU – GAA – GGC – UA	
0.25	السلسلة البيبتيدية بالنسبة لـ P53 غير الفعال: Ser – Glu– Gly	
0.5	حدوث طفرة تمثلت في ضياع النيكليوتيد A رقم 6 ← تغير ترتيب النوكليوتيدات ← تغير تسلسل الأحماض الأمينية ← P53 غير فعال ← عدم كبح RAS ← انقسام عشوائي للخلايا ← خلايا سرطانية.....	

التمرين الثالث (5 نقط)

0.25	بالنسبة للتزاوج الأول: • F_1 متجانس ← تحقق القانون الأول لماندل..... • التحليل المسؤول عن أجنحة طويلة سائد على التحليل المسؤول عن أجنحة أثرية والتحليل المسؤول عن عيون حمراء سائد على التحليل المسؤول عن عيون أرجوانية.....	1
0.5	بالنسبة للتزاوج الثاني: تزاوج إختباري ، لدينا نسبة المظاهر الخارجية الأبوية تفوق بكثير المظاهر الخارجية جديدة التركيب $TP=89,25\% > TR=10,73$ إذن المورثتان مرتبطتان ارتباطا نسبيا (استثناء القانون 3 لماندل).....	

التفسير الصبغي:

0.25	التزاوج الأول: النمط الوراثي: الأم شاج:	$[R,L] \times [r,l]$
0.5	التزاوج الثاني: النمط الوراثي: الأم شاج:	

النقطة	عناصر الإجابة	السؤال																				
0.5	<table border="1"> <tr> <td>$\frac{R}{47.16\%} \quad \frac{L}{}$</td> <td>$\frac{R}{5,42\%} \quad \frac{\ell}{}$</td> <td>$\frac{r}{5,31\%} \quad \frac{L}{}$</td> <td>$\frac{r}{42.09\%} \quad \frac{\ell}{}$</td> <td>♀</td> </tr> <tr> <td>$\frac{R}{47.16} \quad \frac{L}{}$</td> <td>$\frac{R}{5.42\%} \quad \frac{\ell}{}$</td> <td>$\frac{r}{5,31\%} \quad \frac{L}{}$</td> <td>$\frac{r}{42.09\%} \quad \frac{\ell}{}$</td> <td>♂</td> </tr> <tr> <td>$\frac{r}{} \quad \frac{\ell}{47.16}$</td> <td>$\frac{r}{} \quad \frac{\ell}{5.42\%}$</td> <td>$\frac{r}{} \quad \frac{\ell}{5,31\%}$</td> <td>$\frac{r}{} \quad \frac{\ell}{42.09\%}$</td> <td>$\frac{r}{} \quad \frac{\ell}{100\%}$</td> </tr> <tr> <td>[R,L]</td> <td>[R,ℓ]</td> <td>[r,L]</td> <td>[r,ℓ]</td> <td></td> </tr> </table>	$\frac{R}{47.16\%} \quad \frac{L}{}$	$\frac{R}{5,42\%} \quad \frac{\ell}{}$	$\frac{r}{5,31\%} \quad \frac{L}{}$	$\frac{r}{42.09\%} \quad \frac{\ell}{}$	♀	$\frac{R}{47.16} \quad \frac{L}{}$	$\frac{R}{5.42\%} \quad \frac{\ell}{}$	$\frac{r}{5,31\%} \quad \frac{L}{}$	$\frac{r}{42.09\%} \quad \frac{\ell}{}$	♂	$\frac{r}{} \quad \frac{\ell}{47.16}$	$\frac{r}{} \quad \frac{\ell}{5.42\%}$	$\frac{r}{} \quad \frac{\ell}{5,31\%}$	$\frac{r}{} \quad \frac{\ell}{42.09\%}$	$\frac{r}{} \quad \frac{\ell}{100\%}$	[R,L]	[R,ℓ]	[r,L]	[r,ℓ]		
$\frac{R}{47.16\%} \quad \frac{L}{}$	$\frac{R}{5,42\%} \quad \frac{\ell}{}$	$\frac{r}{5,31\%} \quad \frac{L}{}$	$\frac{r}{42.09\%} \quad \frac{\ell}{}$	♀																		
$\frac{R}{47.16} \quad \frac{L}{}$	$\frac{R}{5.42\%} \quad \frac{\ell}{}$	$\frac{r}{5,31\%} \quad \frac{L}{}$	$\frac{r}{42.09\%} \quad \frac{\ell}{}$	♂																		
$\frac{r}{} \quad \frac{\ell}{47.16}$	$\frac{r}{} \quad \frac{\ell}{5.42\%}$	$\frac{r}{} \quad \frac{\ell}{5,31\%}$	$\frac{r}{} \quad \frac{\ell}{42.09\%}$	$\frac{r}{} \quad \frac{\ell}{100\%}$																		
[R,L]	[R,ℓ]	[r,L]	[r,ℓ]																			
0.75		<p>2 يفسر ظهور المظاهر الخارجية جديدة التركيب في F_2 بحدوث ظاهرة العبور الصبغي عند الأنثى أثناء تشكل الأمشاج . رسم تفسيري لظاهرة العبور</p>																				
0.25 0.25	<p>حساب تردد الحليلين A و a قبل الانتقاء: $f(a)=q=0.33+1/2.0.67=0.66$ $f(A)=p= 0+1/2.0.67=0.34$</p> <p>مع $p+q=1$ حساب تردد الحليلين A و a بعد الانتقاء: $f(a)=q=0.5+1/2.0.05=0.75$ $f(A)=p= 0+1/2.0.05=0.25$</p> <p>مع $p+q=1$</p>	3																				
0.25 0.25 0.25 0.25	<p>ارتفاع تردد النمط الوراثي a/a انخفاض تردد النمط الوراثي A/a يمارس الوسط انتقاء تفضيلا على النمط الوراثي aa ← ارتفاع تردد الحليل a في الساكنة يمارس الوسط إنتقاء سلبيا على النمط الوراثي Aa ← إنخفاض مهم في تردد الحليل A في الساكنة</p>	4																				
التمرين الرابع (4 ن)																						
0.5 0.5	<p>أنواع الاستجابة المناعية المتدخلة إثر الإصابة بفيروس VIH : - استجابة مناعية نوعية ذات مسلك خلطي نظرا لتدخل مضادات الأجسام ضد VIH - استجابة مناعية نوعية ذات مسلك خلوي نظرا لتدخل للمفاويات T_8</p>	1																				
0.25 0.25	<p>- ينتج عن العدوى بفيروس VIH : • انخفاض تركيز للمفاويات T_4 و انخفاض تركيز للمفاويات T_8 • ارتفاع متبوع بلنخفاض تركيز مضادات الأجسام ضد VIH</p>	2																				

النقطة	عناصر الإجابة	السؤال
0.25 0.25 0.25 0.25	- ينتج عن تعفن T_4 ← انخفاض تدريجي في T_4 ← عدم تنشيط LT_8 لتحول إلى T_C (استجابة خلوية) ← عدم تنشيط L_B لتحول إلى بلزميات مفرزة لمضادات الأجسام (استجابة خلوية) ← قصور مناعي ← الجسم يصبح عرضة للأمراض الانتهازية	
0.5 0.5 0.5	- يثبت فيروس VIH على المفاويات T_4 بفضل التآلف بين البروتينات الغشائية $gp120$ و $gp41$ للفيروس مع المستقبلات CD_4 و $CCR5$ الغشائية للمفاويات T_4 - يلتحم غشاء الفيروس وغشاء المفاويات T_4 ← حقن المادة الوراثية للفيروس داخل سيتوبلازم T_4 - تفسير: في غياب المستقبل $CCR5$ ← غياب التحام غشاء VIH بغشاء T_4 ← عدم حقن VIH لمادته الوراثية داخل T_4 ← عدم تكاثر VIH داخل المفاويات T_4 ← عدم الإصابة بالعدوى	3
التمرين الخامس (3نقط)		
0.25 0.25 0.25 0.25	- مؤشرات القوى الانضغاطية هي: • وجود فوالق معكوسة وتراكبات • وجود سدائم • وجود طبقات المؤشر الدال على اختفاء محيط هو: وجود خياطة أفيولوتية بين الهامشين القاريين	1
0.25 0.25 0.25 0.5	السحنات المناسبة لصخور المتاكابرو هي: • MG_1 ينتمي لسحنة الشيبست الاخضر لانه يحتوي على التجمع المعدني كلوريت واكتينوت • MG_2 ينتمي لسحنة الشيبست الازرق لانه يحتوي على التجمع المعدني كلوكوفان وايبديوت • MG_3 ينتمي لسحنة الإيكولوجيبت لاحتوائه على التجمع المعدني بجادي وجاديببت نلاحظ عند الانتقال من MG_1 إلى MG_2 إلى MG_3 ارتفاعا مهما في قيمة الضغط وارتفاع ضعيف في درجة الحرارة ← تحول دينامي	2
0.25 0.25 0.25	المراحل المؤدية إلى تشكل سلسلة جبال الألب : - وجود مؤشرات التحول الدينامي ← حدوث طمر - وجود خياطة أفيولوتية ← انغلاق مجال محيطي - وجود تشوهات مهمة دالة على قوى انضغاطية ← اصطدام الصفيحتين	3